

Denne side er udskrevet fra www.akvariefisk.dk

Taxonomi

Artsnavn (latinsk navn):	Bunocephalus coracoideus
Populærnavn (dansk navn):	Banjo malle
Familie (latin):	Aspredinidae
Type:	Ferskvand, Tornmaller og Banjomaller
Opdager (beskrevet af):	Cope, 1878

Førstegangs opdræt i DK:

Levested

Verdensdel:	Asien.
Biotop (beskrivelse af regionen):	Sortvandsbiotoper. Arten lever mellem grene og nedfaldne blade, hvor den er godt kamufleret.

Udseende

Størrelse:	12-15 cm
Form:	Fisken har fået sit populærnavn, fordi den ganske enkelt ligner en banjo. Hovedet og forkroppen er næsten rundt, bagkroppen og halen lang og tynd. Fisken har som de fleste maller en ret flad kropsform.
Farve:	Forskellige nuancer af brun.
Kønsforskel:	Hunnerne er en anelse større og dybere i kroppen.
Varianter:	Ingen kendte. <i>B. coracoideus</i> er blot den mest almindelige banjomalle i handlen. Der findes en række lignende arter, som afviger mere eller mindre i udseende og farve.

Behov

Dekorationer:	Disse maller elsker at gemme sig i visne blade. I akvariet kan man fx bruge visne bøgeblade, som er blevet skoldet kort. I mangel af sådanne vil fisken ofte gemme sig under trærodder eller grave sig ned, hvis bundlaget er fint sand.
Adfærd:	Banjomaller er fredelige overfor andre fisk. De er skumringsaktive, og kommer kun frem om dagen, når der fodres. Derudover ligger de bare stille, og kan ligge på det samme sted i akvariet hele dagen, så man ofte kommer til at tro, at fisken er død og derfor lige pirker til den.
Social:	Fiskene er ikke sociale indbyrdes. De synes overho
Foder:	Synkende mallefoder, pellets, frostfoder. Hvis der er mange andre, livligt spisende fisk i akvariet, er det bedst at fodre efter lyset er slukket, så man er sikker på, at banjomallerne får noget.

Vandet

Akvariestørrelse:	200
Niveau:	Bund zone
Vandcirkulation:	Middel
Min. pH:	5,5
Max. pH:	7,5
Min. dH:	2
Max. dH:	20
Min Temperatur:	
Max Temperatur:	
Belysning:	Vælg

Formering

Ynglebiologi:	Detaljerne omkring ynglebiologien er endnu meget uklare, da de opdrætstilfælde, der har været, har været tilfældige og legen er foregået om natten. Nogle kilder siger, at mallerne yngler i gruppe, andre parvis.
Drægtighed:	De op til 4.000 æg, som smides i klynger på bunden, klækker efter tre dage.
Leg:	Vides ikke med sikkerhed
Øvrigt omkring opdræt og yngel:	Ungerne fodres nemt op med artemia, knust tørfoder og lignende, småt foder. Senere med hakkede myggelarver.

Øvrige oplysninger

Generel beskrivelse

Forfatter: Elisabeth Schrøder



Få flere informationer på www.akvariefisk.dk